

**Neenah Joint School District
Department of Curriculum and Instructional Support Services
Food Allergy Action Plan**

PLAN DE ACCIÓN PARA ALERGIAS DE COMIDA

Estudiante _____ Fecha _____

Dirección _____ Escuela _____ Grado _____

Padre/Guardián _____ Teléfono _____

Teléfono celular _____ Trabajo del padre _____ de la madre _____

Médico _____ Teléfono del médico _____

Contacto de emergencia _____ Teléfono _____

Este estudiante tiene una ALERGIA A: _____

Síntomas de una reacción pequeña

- boca los labios, lengua o boca pican y se hinchan
- piel sarpullido que pica, y/o la cara o extremidades se hinchan
- intestinos náusea, calambres del estómago, vómito, y/o diarrea

La severidad de los síntomas puede cambiarse rápidamente. Todos los síntomas pueden progresar a una situación que amenazca la vida.

Procedimiento a una reacción pequeña

- dispensar _____ (medicamento/dosis)
- llamar 1. _____ (nombre/teléfono)
- 2. _____ (nombre/teléfono)
- 3. _____ (nombre/teléfono)
- Siga observando al estudiante. Si los síntomas continúan, siga el procedimiento para una reacción grande.

Síntomas de una reacción grande

- garganta la garganta pica y/o se siente apretada, está ronco, tiene toz seca
- pulmón respiro corto, toz repetitiva, y/o está resollando
- corazón pulso delgado, desmayarse

Procedimiento a una reacción grande

- dispensar _____ (medicamento/dosis)
- llamar 911
- llamar 1. _____ (nombre/teléfono)
- 2. _____ (nombre/teléfono)
- 3. _____ (nombre/teléfono)

Firma de un padre/guardián _____ Fecha _____

Firma del director de la escuela _____ Fecha _____

- Favor de llamar a la enfermera de la escuela si el estado de la salud de su hijo/a cambia durante el año escolar (886-6155)
- Esta información se compartirá con los que trabajan con su hijo/a en la escuela

Si su hijo/a necesita medicamentos durante las horas escolares, tiene que tener archivado el documento llamado Medication Consent Form firmado por su doctor para ESTE año escolar.

INSTRUCCIONES PARA EL EPIPEN Y EPIPEN JR EpiPen está

- 1. Quite la tapa gris para activarlo**
- 2. Pon la punta negra contra el muslo de afuera**
- 3. Hurgonee la punta negra en el muslo de afuera hasta que el mecanismo funcione. Agarrelo así hasta contar a 10. Se debe sacar el EpiPen y llevarlo a la sala de emergencia en el hospital. De un masaje a la area donde estuvo el EpiPen por 10 segundos.**

Miembros de la escuela que son entrenados	Número de sala
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	